

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège  
rédigé en collaboration avec MM. Dovale, Boyer, Sicard, Escande, Duboin, Vène,  
Bonhotte, Faure et Bize

N° 7 C du 28 Mars 1990


GRANDES CULTURES N° 4

BLE ..... EST SECTEUR (Est Lauragais et Razès) OBSERVEZ - TRAITEZ

POIS ..... Cultures déjà traitées Pas d'intervention  
Cultures non traitées (semences en particulier) TRAITEZ

## BLE : ROUILLE BRUNE

Cette maladie est bien installée; le Razès et les variétés sensibles sont plus concernées que les variétés résistantes



MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67 92 41 42



Les blés durs les plus atteints s'observent sur les variétés suivantes:

**Goal, Agrial, Primadur, Ambral, Mondur**

Sur Capdur, sauf cas particulier (1 parcelle observée très atteinte) le traitement peut être différé

La Rouille est déjà bien installée sur F4; il convient donc, dès à présent, de protéger vos cultures afin de préserver les étages foliaires supérieurs

Vous devez observer minutieusement vos parcelles plus particulièrement dans les secteurs limitrophes du Razès et du Limouxin

Dans la partie Ouest du secteur, Lauragais et piège sauf cas particulier aucune intervention n'est nécessaire pour le moment

Pour les parcelles concernées traitez à l'aide d'une des solutions suivantes:

SUMISTAR	2,5 l/ha
PLANETE R	1,5 l
ALTO AMBEL	0,5 l

NB: en condition venteuse et sèche choisissez de préférence le matin tôt ou la fin de journée pour appliquer vos fongicides

## POIS PROTEAGINEUX

Les populations de **PUCERONS** sont toujours importantes

On peut observer l'apparition des premières **BRUCHES**; l'activité de ces insectes est liée aux conditions du milieu, une température élevée est nécessaire (sup. à 20° C);

**le risque sera effectif avec l'amélioration des conditions climatiques actuelles**

L'**ANTHRACNOSE** est présente à la base; à l'approche de la floraison il conviendrait d'assurer la protection de ces cultures

**SI VOUS AVEZ TRAITE** à la suite des conseils diffusés dans le dernier bulletin **ATTENDEZ**  
**SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE PROTEGE VOS CULTURES**, et plus particulièrement les pois destinés à la production de semences, **VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT LE FAIRE** à réception du présent avis

<b>ANTHRACNOSE - PUCERONS - BRUCHES :</b>	<b>FONGICIDE</b>	<b>PELTAR FLO</b>	<b>5</b>	<b>l/ha</b>
		<b>BRAVO PLUS</b>	<b>2</b>	<b>l</b>
		<b>CERECLAIR</b>	<b>2</b>	<b>l</b>
		<b>IMPACT RM</b>	<b>1,5</b>	<b>l</b>
<b>+ INSECTICIDE</b>		<b>SERK</b>	<b>1,5</b>	<b>l</b>

**Anthraxose - Pucerons - ou cultures non destinées à la semence et présence de Bruches peu importante**

rajoutez au fongicide un des insecticides suivants	<b>PIRIMOR</b>	<b>0,5</b>	<b>kg/ha</b>
	<b>KARATE</b>	<b>0,125</b>	<b>l</b>
	<b>MAVEIK</b>	<b>0,2</b>	<b>l</b>

**P.S.** Certains d'entre vous ont reçu un appel téléphonique émanant d'un organisme agricole (distributeur) d'un département voisin, faisant état de présence importante de maladies sur céréales et vous enjoignant de traiter

Nous réprouvons cette pratique, d'autant plus qu'il existe comme vous le savez, un réseau de surveillance des cultures, regroupant les techniciens de tous les organismes du département, Coopératives, GDA, SPV; ils surveillent en permanence l'ensemble des cultures, font le point 1 fois par semaine et vous proposent un Avertissement Agricole quand cela est nécessaire

Vous n'avez donc pas à suivre de conseils hors ceux adressés par les Avert.Agricoles, par votre technicien, ou ceux éventuels, émis par le service d'appel de votre coopérative